



Flegamina Fast 8mg tabletki 20 szt.

Cena: 14,52 zł



Opis słownikowy

Producent	TEVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki ulegające rozpadowi

Dawka

8mg

Opakowanie

20 szt.


Działanie

Lek **Flegamina Fast** zawiera substancję czynną **bromoheksyny chlorowodorek**. Wykazuje on działanie wykrztuśne, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. To działanie ułatwia rzęskom (niewielkim włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie jej z płuc. Substancja czynna **bromoheksyny chlorowodorek** ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Sposób użycia



Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku** - 1 tabletkę 3 razy na dobę.

Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 48mg (dawka maksymalna) (2 tabletki 3 razy na dobę, co odpowiada 48mg bromoheksyny).

- **Młodzież w wieku powyżej 12 lat** - 1 tabletkę 3 razy na dobę, maksymalnie do 6 tabletek na dobę (co odpowiada 48mg bromoheksyny)
- **Dzieci w wieku od 2 do 12 lat** - wskazane jest stosowanie innego leku - **Flegamina Fast Junior o mocy 4mg**.

Podawać doustnie. Tabletek **Flegamina Fast** nie należy dotykać mokrymi dłońmi, gdyż mogą się rozpaść. Tabletkę **Flegamina Fast** ulegającą rozpadowi w jamie ustnej, należy umieścić w jamie ustnej, gdzie w ciągu około 30 sekund rozproszy się w ślinie i może być łatwo połknięta. Bezpośrednio przed podaniem leku, tabletkę można rozpuścić na łyżce w niewielkiej ilości wody pitnej. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 5 dni stosowania u osób dorosłych lub po upływie 3 dni stosowania u młodzieży powyżej 12 lat nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 8mg chlorowodoru bromoheksyny.

Pozostałe składniki to: Mannitol, Krospowidon (typ B), Sukraloza, Krzemionka koloidalna bezwodna, Magnezu stearynian, Aromat truskawkowy S-144940 o składzie: Naturalne substancje aromatyzujące, preparaty aromatyzujące, Maltodekstryna kukurydziana, Skrobia modyfikowana kukurydziana woskowata.