



Floractin kolki, krople doustne 5ml



Cena: 22,50 zł

Opis słownikowy

Producent NOVASCÓN

Opis produktu

Postać

Krople doustne

Opakowanie

Buteleczka 5 ml

Skład

Pediococcus pentosaceus CECT 8330, Bifidobacterium longum CECT 7894, olej słonecznikowy, przeciwutleniacz -mieszane tokoferole.

8 kropli zawiera: - wartość energetyczna 2,98kcal/12,49kJ, - białko 0,01g, - węglowodany 0,02g (w tym: cukry 0,002g), - tłuszcz 0,32g (w tym: nasycone kwasy tłuszczowe 0,04g, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 0,09g, wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,19g), - sól 0,002g, - Pediococcus pentosaceus CECT 8330; Bifidobacterium longum CECT 7894 1×10^9 CFU

100ml zawiera: - wartość energetyczna 836 kcal/3498 kJ, - białko 3,7g, - węglowodany 4,8g (w tym: cukry 0,7g), - tłuszcz 88,6g (w tym: nasycone kwasy tłuszczowe 10,8g, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 25,3g, wielonienasycone kwasy tłuszczowe 52,5g), - sól 0,7g, - Pediococcus pentosaceus CECT 8330; Bifidobacterium longum CECT 7894 $2,8 \times 10^{11}$ CFU *CFU (colony forming units) - jednostki tworzące kolonie.

Działanie

Bakterie zawarte w preparacie ze względu na metabolizm klasyfikuje się jako homofermentatywne, czyli wytwarzające wyłącznie kwas mlekowy, bez produktów ubocznych np. gazów, co może być istotne w przypadku niemowląt, u których występują kolki. Pediococcus



pentosaceus CECT 8330 oraz Bifidobacterium longum CECT 7894 są szczepami, których działanie zostało potwierdzone w badaniu klinicznym. Badanie to zostało przeprowadzone na niemowlętach karmionych mlekiem modyfikowanym oraz pokarmem kobiecym. Udowodniono, że podawanie zawartych we Floractin kolki w rekomendowanej dawce dziennej skraca czas trwania płaczu u niemowląt których występują kolki. Potwierdzono również brak efektów ubocznych oraz tolerancję.

Wskazania

Kolki u niemowląt.

Sposób użycia

8 kropli dziennie podawanych jednorazowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może wskazać inny sposób dawkowania. Produkt wstrząsnąć przed użyciem. Krople dodać do spożywanego pokarmu lub podać bezpośrednio do ust. Nie należy mieszać preparatu ze zbyt zimnymi lub gorącymi posiłkami.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest przez dziecko w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.