



apteka  
w sieci

## Fresubin Energy Drink smak waniliowy 200 ml x 4 szt.

Cena: 28,45 zł

### Opis słownikowy

Producent	Fresenius Kabi
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



### Opis produktu

#### Postać

Płyn

#### Opakowanie

Buteleczki 4x200ml (smak waniliowy)

#### Skład

Woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), sacharoza, aromat, cytrynian potasu, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), chlorek sodu, chlorek potasu, cytrynian potasu, wit. C, chlorek choliny, tlenek magnezu, pirofosforan żelaza, regulator kwasowości (E 330), siarczan cynku, niacyna, Wit. E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, Wit. B6, Wit. B2, fluorek sodu, beta-karoten, Wit. B1, Wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, Wit. K1, jodek potasu, solenin sodu, biotyna, Wit. D3, Wit. B12

#### Działanie

**Fresubin Energy Drink** to kompletna pod względem odżywczym dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), dostarczająca 300 kcal oraz 11,2 gram białka w jednym opakowaniu. Już 3 opakowania produktu pokrywają przeciętne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminy i składniki mineralne. Nie zawiera glutenu, błonnika i jest klinicznie wolny od laktozy. Uzupełnia niezbędną dawkę energii w formie napoju, który gotowy jest do spożycia bezpośrednio z butelki.

*Dostępne również w smaku czarnej porzeczki, czekoladowym i truskawkowym.*



## Wskazania

Osoby zagrożone niedożywieniem lub niedożywione, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, okres pooperacyjny, osoby w podeszłym wieku, choroby wyniszczające.

## Dawkowanie

Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelki (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.

## Sposób użycia

Pić powoli. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.

## Ostrzeżenia

Należy stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.