




apteka
w sieci

Groprinosin 500 mg tabletki 50 szt.

Cena: 32,52 zł



Opis słownikowy

Producent	GEDEON RICHTER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

1 op. 50 tabletek

Dawka

500mg

Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Działanie

Lek wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Wskazania

Lek polecany wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Lek dla



dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych.

Sposób użycia

apteka
w sieci

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka dobową wynosi 6 tabletek (3 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 8 tabletek (4 g) w ciągu doby (czyli 2 tabletki 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Lek należy stosować doustnie. Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

Działania niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi, nudności z wymiotami lub bez, ból brzucha, swędzenie skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw), bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, bóle stawów.