

# Groprinosin Forte 1000 mg tabletki 30 szt.

Cena: 33,96 zł



## Opis słownikowy

Producent	GEDEON RICHTER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tabletki

### Opakowanie

30 szt.

### Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletkę zawiera 1000mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

### Działanie

Lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego). Lek **Groprinosin Forte** zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy *Herpes*.

### Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*).



Lek **Groprinosin Forte** może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

#### Sposób użycia

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletki można rozkruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu.

#### Zalecana dawka

##### Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka dobową wynosi 3 tabletki (3g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki (4g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 4 razy na dobę).

##### Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia

Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie leku Groprinosin Forte w syropie.

Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

#### Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczaniowej (silny ból stawu z obrzękiem stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.