




apteka
w sieci

Groprinosin Forte 500mg/5ml syrop 150 ml



Cena: 18,59 zł

Opis słownikowy

Producent	GEDEON RICHTER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Syrop

Postać

150ml

Działanie

Groprinosin Forte to lek przeciwwirusowy, zwiększający odporność organizmu. Preparat zawiera substancję czynną - inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazania

Wspomaganie odporności, leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpse simplex).

Sposób użycia

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4g inozyny pranobeks na dobę (czyli 40ml syropu na dobę).

Dzieci powyżej 1 roku życia



Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50mg/kg masy ciała na dobę (0,5ml syropu na 1 kg ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

TABELA DAWKOWANIA

Masa ciała dziecka	D
10 - 14 kg	3 x
15 - 20 kg	3
21 - 30 kg	3
31 - 40 kg	3
41 - 50 kg	3

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudność w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Ostrzeżenia

Należy omówić stosowanie leku z lekarzem jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczowej lub zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu, a także czy w przeszłości u pacjenta występowała kamica nerkowa.

Skład

1ml syropu zawiera 100mg inozyny pranobeks.

Pozostałe składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), maltitol ciekły (E 965) (maltitol sorbitol), sacharyna sodowa (E 954), sukraloza (E 955), sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, aromat malinowy L-144739 (cukry, glikol propylenowy, etanol, naturalne substancje aromatyzujące) oraz aromat malinowy 10721-31 (dietylu malonian, etylu octan, aldehyd octowy, trans-2 heksanol, β -Damascenon, maltodekstryna skrobiowa, guma arabska).