



apteka
w sieci

GYNOXIN OPTIMA 200mg kapsułki dopochwowe x 3 szt.

Cena: 31,80 zł



Opis słownikowy

Producent	RECORDATI
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Kapsułki dopochwowe

Opakowanie

3 kapsułki

Skład

Co zawiera lek na infekcje intymne Gynoxin Optima – skład:


Substancją czynną Gynoxin Optima, leku bez recepty na mieszane i grzybicze infekcje intymne jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).

Substancje pomocnicze to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Postać farmaceutyczna: kapsułka dopochwowa, miękka

Działanie

Gynoxin Optima to lek bez recepty na mieszane i grzybicze infekcje intymne. Działa bezpośrednio na przyczynę infekcji. **Gynoxin** to jedyne kapsułki dopochwowe na rynku, zawierające fentikonazol – pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, działa również przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.



- Najczęściej wybierany lek na infekcje intymne w Polsce!
- Tylko 3 dni kuracji – aplikacja raz na dobę.
- Wysoka skuteczność potwierdzona w licznych badaniach klinicznych.
- Dostępny bez recepty!

Wskazania

Kapsułki dopochwowe Gynoxin Optima wskazane są do stosowania przy grzybiczym zapaleniu pochwy i sromu (drożdżyca pochwy i sromu) oraz w leczeniu zakażeń mieszanych pochwy. Lek na infekcje intymne Gynoxin Optima można zastosować, jeśli kobieta skarży się na:

- silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych;
- ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu;
- upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe.

Sposób użycia

Dawkowanie - jak stosować Gynoxin Optima.

1 kapsułka dopochwowa raz na dobę, przez 3 kolejne dni.

Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kapsułki dopochwowe Gynoxin Optima są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować ich doustnie.

Przeciwwskazania

Przy nadwrażliwości na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Kapsułek dopochwowych na infekcje intymne Gynoxin Optima nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi. Lek zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Stosowanie leku na infekcje intymne Gynoxin Optima należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
- jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu. W czasie stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji,
- wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek,
- objawy nie zmniejszą się w ciągu 24 godzin lub się nasilą,
- partner również uległ zarażeniu,
- u pacjentki wystąpiły więcej niż dwa zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku



- pacjentka nie ukończyła 16-ego roku życia,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

- nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
- upławy zabarwione krwią,
- rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
- ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
- działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z

W przypadku rozgryzienia i/lub połknięcia kapsułki dopochwowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Gynoxin Optima w ciąży i w czasie karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Gynoxin Optima powinien być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią pod nadzorem lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gynoxin Optima nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Jeśli lek Gynoxin Optima jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- uczucie pieczenia sromu i pochwy
- wysypka rumieniowa.

Przechowywanie

Leku nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.