



apteka
w sieci

Hirudoid 0,3 g/100 g żel 40 g

Cena: 16,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	żel
Producent	STADA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

żel

Opakowanie

Tubka 40g

Skład

100 g żelu zawiera: polisarczan mukopolisacharydowy 0,3 g odpowiada 25000 j. substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, olej aromatyczny, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropyloowy, woda oczyszczona.

Wskazania

Polisarczan mukopolisacharydowy należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku, tępych urazów z krwinkami lub bez nich. Leczy również zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym. Zalecany do leczenia żyłaków oraz stanów zapalnych żył. Preparat zapobiega powstawaniu zakrzepów powierzchniowych, pobudza ich wchłanianie oraz wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, a także przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków.

Dawkowanie

Preparat jest lekiem do stosowania miejscowego na skórę. Należy nakładać 2 do 3 razy dziennie miejsca zmienione chorobowo, jeżeli zachodzi potrzeba częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zwykle wystarcza od 3 do 5 cm maści. W przypadku tępych urazów leczenie trwa zwykle do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni.



Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu i nie nakładać na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania preparatu. 4-hydroksybenzoesan metylu i propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

Uwagi:

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.