



apteka
w sieci

Hirudoid 0,3 g/100g maść 40 g

Cena: 19,23 zł



Opis słownikowy

Producent	STADA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Producent:

STADA

Postać

Maść

Opakowanie

Tubka 40g


Skład

Substancją czynną leku jest polisarczan mukopolisacharydowy 0,3 g. Pozostałe składniki to glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Wskazania

Polisarczan mukopolisacharydowy należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku, tępych urazów z krwinkami lub bez nich. Leczy również zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym. Preparat może być także stosowany do fono i jonoforezy. Zalecany do leczenia żyłaków oraz stanów zapalnych żył.

Dawkowanie



Preparat jest lekiem do stosowania miejscowego na skórę. Należy nakładać 2 do 3 razy dziennie miejsca zmienione chorobowo, jeżeli zachodzi potrzeba częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zwykle wystarcza od 3 do 5 cm maści. W przypadku tępych urazów leczenie trwa zwykle do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu i nie nakładać na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania preparatu. 4-hydroksybenzoesan metylu i propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

Uwagi:

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.