



apteka  
w sieci

# Hitaxa Fast Junior 2,5mg tabletki rozpadająca się w ustach x 10 szt.

Cena: 13,61 zł

## Opis słownikowy

Producent	ADAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



## Opis produktu

### Postać

Tabletki rozpuszczalne w ustach

### Opakowanie

1 op. 10 tabletek

### Dawka


2,5mg

### Skład

Desloratadinum, każda tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny Pozostałe składniki: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

### Działanie

Hitaxa fast to lek przeciwalergiczny niewywołujący senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. Hitaxa fast łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład



katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

#### Wskazania

Przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat lub dorosłych, w łagodzeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

#### Sposób użycia

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: jedna tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast raz na dobę. Tabletkę należy zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Czas trwania leczenia lekiem Hitaxa fast Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. Sposób podawania: dawka może być przyjmowana niezależnie od posiłku. Bezpośrednio przed użyciem blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć bez kruszenia tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega on natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połączyć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.

#### Uwaga

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Przeciwwskazania

Nie stosować leku jeśli pacjenta występuje uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku lub na loratadynę. Dzieci poniżej 6 roku życia. Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast w ciąży lub w okresie karmienia piersią.