



apteka
w sieci

Ibum Forte 200mg/5ml zawiesina doustna, smak truskawkowy 100ml



Cena: 26,40 zł

Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Zawiesina

Dawka

200mg/5 ml

Opakowanie

Butelka 100 ml

Działanie

Lek **IBUM FORTE** w formie zawiesiny doustnej o smaku truskawkowym zawiera ibuprofen - substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wykazujących działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Preparat wskazany jest do stosowania:

- w stanach gorączkowych różnego pochodzenia między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, jak również w przebiegu odczynu poszczepiennego,



- w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takich jak:
 - bólach głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),
 - bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle wywołane ząbkowaniem,
 - bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
 - bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
 - bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego,
 - bóle pooperacyjne.

Sposób użycia

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Wiek dziecka (masa ciała dziecka)	Dawka jednorazowa
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	1,25 ml (50 mg)
6-12 miesięcy (7-7,9 kg)	1,25 ml (50 mg)
1-3 lata (10-15 kg)	2,5 ml (100 mg)
4-6 lat (16-20 kg)	3,75 ml (150 mg)
7-9 (21-29 kg)	5 ml (200 mg)
10-12 lat (30-40 kg)	7,5 ml (300 mg)
powyżej 40 kg	7,5-10 ml (300-400 mg)

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych.

Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją (przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występujących po zastosowaniu NLPZ.
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
- w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorikoksyb),
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienia w mózgu (krwawienia z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

Jeśli osoby dorosłe przyjmują ten lek, nie należy go przyjmować w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Skład

5ml zawiesiny zawiera: substancję czynną: 200mg / substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa,



sodu benzoesan (E 211), kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat truskawkowy (zawiera glikol propylenowy E 1520),
woda oczyszczona.

apteka
w sieci