

Ibupar Forte 400mg tabletki powlekane x 10 szt.

Cena: 5,94 zł



Opis słownikowy

Producent	ADAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Dawka

400 mg

Opakowanie

10 tabletek

Skład

Ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumarany, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 4000, lak z żółcieniem pomarańczową, czerwień koszulinowa

Działanie

Ibupar Forte jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o szerokim spektrum działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego. Skuteczny w znoszeniu bólu o różnym natężeniu. Ibuprofen jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie ibuprofenu w surowicy występuje po 1 do 2 godzin od podania doustnego. Pokarm i leki zobojętniające sok żołądkowy nie hamują wchłaniania ibuprofenu.



Wskazania

Preparat znosi bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia w przebiegu grypy i przeziębienia. Bolesne miesiączkowanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca. Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Ostatnie trzy miesiące ciąży. Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Skaza krwotoczna.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Dawka początkowa wynosi 400 mg (1 tabletką) jednorazowo lub 400 mg (1 tabletką) co 4 do 6 godzin, w miarę potrzeby.