

# Ibuprom MAX RAPID 400mg tabletki 24 szt.

Cena: 21,52 zł



## Opis słownikowy

Dawka	400 mg
Opakowanie	24 szt.
Postać	tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Opakowanie

24 szt.

### Działanie

Lek IBUPROM MAX RAPID zawiera 400mg ibuprofenu w postaci 512mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego. Ibuprofen należy do leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wykazujących właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

### Wskazania

Lek IBUPROM MAX RAPID wskazany jest do stosowania w przypadku:

ostrego bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego:

- bólu głowy
- migreny z aurą lub bez (wraz z objawami dodatkowymi, takimi jak nudność, nadwrażliwość na światło i dźwięk);
- napięciowe bóle głowy;



- bóle zębów;
- bóle mięśniowe, stawowe i kostne;
- bolesne miesiączkowanie;
- nerwobóle;
- bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu.

Gorączki różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

#### Sposób użycia

- **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** 1 tabletkę co cztery godziny. Tabletki popijając wodą. Nie stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby.

#### Ostrzeżenia

Leku **IBUPROM MAX RAPID** nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u których występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, katar, obrzęk naczynioruchowych lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- z czynną lub występującą w przeszłości chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
- z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego, w przeszłości, związanym z wcześniejszym leczeniem NLPZ;
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca;
- w III trymestrze ciąży;
- ze skazą krwotoczną;
- w wieku poniżej 12 lat.

#### Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen - 1 tabletkę powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci 512mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego. Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna (200M), sodu laurylosiarczan, krospowidon, powidon (K-30), krzemionka, koloidalna uwodniona, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian; Otoczka (Opadry fx 64F580006): hypromeloza 2910, laktoza jednowodna, makrogoł (E1521), potasowo-glinowy krzemian (E 555) / tytanu dwutlenek (E 171), talk, tytanu dwutlenek (E 171), sodu cytrynian.