



Ibutact 40mg/ml zawiesina doustna 200 ml

Cena: 19,90 zł



Opis słownikowy

Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Zawiesina

Opakowanie

Butelka 200 ml

Działanie

Lek **Ibutact** zawiera substancję czynną ibuprofen należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) mających działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Wskazania

- Gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego
- Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
 - ból głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych)
 - bóle stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia)
 - bóle na skutek urazów tkanek miękkich,



- bóle pooperacyjne,
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Ibuct jest wskazany dla dzieci o masie ciała powyżej 5 kg (w wieku powyżej 3 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych.

Sposób użycia

Lek jest przeznaczony do codziennego stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką.

Wiek dziecka (Masa ciała dziecka)	Dawka jednorazowa
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	1,25 ml (50 mg)
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	1,25 (50 mg)
1-3 lat (10-15 kg)	2,5 ml (100 mg)
4-6 lat (16-20 kg)	3,75 ml (150 mg)
7-9 lat (21-29 kg)	5 ml (200 mg)
10-12 lat (30-40 kg)	7,5 ml (300 mg)
Powyżej 12 lat (powyżej 40 kg)	7,5 ml - 10 ml (300-400 mg)

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować produktu

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia;
- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma oskrzelowa, katar, swędząca wysypka skórna lub obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (takich jak aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku) oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
- jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z perforacją lub krwawieniem, lub jeśli u pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości;
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (dziecko może mieć wymioty zawierające krew lub ciemne cząstki wyglądające jak fusy z kawy lub smoliste stolce zawierające krew);
- jeśli pacjent ma zwiększoną tendencję do krwawień lub problemy z wytwarzaniem niektórych składników krwi (takie jak niedobór płytek krwi – małopłytkowość);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;
- jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;
- jeśli pacjent jest odwodniony;
- jeśli dziecko waży mniej niż 5 kg i jest w wieku poniżej 3 miesięcy;
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna;
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.

Skład



1 ml zawiesiny zawiera 40 mg ibuprofenu. Lek zawiera sorbitol ciekły niekryształizujący, glikol propylenowy i sodu benzoosan (E 211).