



Iladian kapsułki doustne x 10 szt.

Cena: 15,04 zł



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać leku:

Kapsułki

Opakowanie:

10 kapsułek

Skład:

Lactobacillus rhamnosus GR1, Lactobacillus reuteri RC-14, żelatyna, Lactobacillus gasseri, laktoferyna, likopen, stearynian magnezu (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik). Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Działanie:

Iladian to doustny probiotyk dla kobiet na problemy intymne, który posiada aż 6 mld bakterii probiotycznych, które pomagają odbudować fizjologiczną mikroflorę pochwy. Dodatkowo, Iladian zawiera 2 substancje aktywne, laktoferynę i likopen, dzięki którym wspiera odporność kobiety przy problemach intymnych.

Wskazania:

Zalecany:

- pomocniczo, w celu zachowania zdrowia intymnego kobiety, przez korzystny wpływ na utrzymanie fizjologicznego środowiska pochwy,



- wspomagająco, w celu uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej oraz odtworzenia właściwego odczynu (pH) pochwy,
- osłonowo, dla zachowania naturalnej mikroflory w trakcie i po antybiotykoterapii,
- osłonowo, dla utrzymania fizjologicznej mikroflory podczas stosowania preparatów przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych, przeciwzapalnych i po zakończeniu ich stosowania,
- dla kobiet stosujących antykoncepcję (w tym hormonalną),
- pomocniczo, przy niedyspozycjach kobiecych, podczas menstruacji,
- dla diabetyczek i kobiet w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
- kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ostrzeżenia:

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie:

Doustnie 1 kapsułka dziennie, popijając szklanką wody. Dla uzyskania pożądaných efektów należy przyjmować preparat przez co najmniej 20 dni. W trakcie doustnej terapii antybiotykowej lub doustnego przyjmowania innych leków przeciwbakteryjnych preparat należy spożywać, zachowując co najmniej 2 godziny odstępu przed lub po przyjęciu antybiotyku lub innego leku przeciwbakteryjnego.