



Inaldin Gardło MAX 3 mg/ml aerozol 30ml

Cena: 16,08 zł



Opis słownikowy

Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

Pojemnik 30ml

Działanie

Lek w aerozolu **Inaldin Gardło MAX** zawiera benzydaminę, należącą do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym. Preparat wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także działa miejscowo znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej.

Wskazania

Leczenie objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Sposób użycia

Zalecana dawka

- **Osoby dorosłe** - każdorazowo od 2 do 4 dawek (rozpyleń) aerozolu, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Nie należy stosować leku **Inaldin Gardło MAX** dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.



Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek. 1 ml leku Inaldin Gardło zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru, co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklaminian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbat 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej (zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol), kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.