



# Inflanor Max 400 mg tabletki powlekane 20 szt.

Cena: 6,70 zł



## Opis słownikowy

Dawka	400 mg
Opakowanie	20 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	ZENTIVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Opakowanie

20 szt.

### Działanie

**Inflanor Max** należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

### Wskazania

Lek **Inflanor Max** wskazany jest do stosowania w krótkotrwałym, objawowym leczeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takim jak:

- ból pleców oraz bóle mięśni i stawów,
- ból głowy (w tym migrenowy ból głowy),
- ból zębów,
- bolesne miesiączkowanie.



**Inflanor Max** może być stosowany w ostrych dolegliwościach bólowych i gorączce związanej z przeziębieniem. Lek przeznaczony jest do stosowania dorosłych i młodzieży od 40 kg masy ciała (w wieku powyżej 12 lat).

#### Sposób użycia

Dorośli i młodzież od 40kg (w wieku powyżej 12 lat) - jedna tabletkę 3-4 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 3 tabletek.

Migrenowe bóle głowy - przyjmować jedną tabletkę 1-3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Ból miesiączkowy - przyjmować jedną tabletkę przy pierwszych oznakach bólu związanego z miesiączką 1 do 3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni od wystąpienia gorączki lub migrenowego bólu głowy lub 5 dni bólu u dorosłych. W przypadku nastolatków należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa.

#### Ostrzeżenia

Kiedy nie przyjmować leku **Inflanor Max**:

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości w postaci astmy, kataru, swędzącej wysypki na skórze lub obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po przyjęciu leków kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały nawracające wrzody lub krwawienie z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) z dwoma lub więcej takimi epizodami w przeszłości.
- jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia procesu tworzenia się krwi lub zaburzenia krzepnięcia krwi.
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek. – jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niewystarczającej ilości płynów).
- jeśli u pacjenta występuje jakiegokolwiek aktywne krwawienie (w tym w mózgu).
- jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

#### Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletkę leku Inflanor Max zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910/5, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza 2910/5, makrogol 300, talk, tytanu dwutlenek (E 171).