

# Isla Medic acute pastylki miodowo-cytrusowe x 20 szt.

Cena: 18,71 zł



## Opis słownikowy

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Producent   | ENGELHARD                |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

## Opis produktu

### Postać

Pastylki

### Opakowanie

20 szt.

### Skład

Pastylki zawierają wodny wyciąg z płucnicy islandzkiej (0,4-0,8:1), karbomer, gumę ksantanową, hialuronian sodu.

Guma arabska, sorbitol, maltitol, bezwodny kwas cytrynowy, acesulfam K, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy, substancje aromatyczne, ekstrakt z roślin barwiących (jabłko, szafran, cytrus), trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

1 pastylka zawiera zamiennik cukru: sorbitol (0,11g) i maltitol (0,92g) = 0,09 jednostki chlebowej.

### Działanie

Pastylki **Isla medic acute** zawierają hydrożelowy kompleks zawierający **karbomer** i **gumę ksantanową** oraz **kwas hialuronowy**, które tworzą na śluzówce warstwę ochronną. Dodatkowo, **kwas hialuronowy** obecny w produkcie tworzy na powierzchni błon śluzowych wilgotną powłokę. Podczas ssania pastylki, uwalniany jest **wyciąg z płucnicy islandzkiej**, który pokrywa okolice jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienia.

Pobudza to wydzielanie śliny, dzięki czemu błona śluzowa ma możliwość zregenerowania się, a najczęstsze objawy towarzyszące



przeziębieniu i podrażnieniom gardła np. drapanie w gardle i chrypka, suchość błony śluzowej oraz związany z nimi ból gardła i trudność w przełykaniu szybko ustępują.

#### **Wskazania**

Łagodzenie dolegliwości związanych z przeziębieniem i bólem gardła, takich jak drapanie lub chrypka.

#### **Sposób użycia**

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: do 6 pastylek dziennie w zależności od zapotrzebowania. Pastylki należy ssać powoli aż do ich całkowitego rozpuszczenia.

Preparat może być stosowany przez dłuższy okres lub z przerwami. Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa lub objawy nasiliły się (pojawi się gorączka lub bóle stawów) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Ostrzeżenia**

Preparatu nie należy stosować w przypadku nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem pastylek należy skonsultować się z lekarzem.