



apteka  
w sieci

# JUVIT D3 MAX krople doustne 10 ml

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

Cena: 15,89 zł



## Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Roztwór

### Opakowanie

Butelka 10ml

### Działanie

**Juvit D3 MAX** w formie kropli doustnych zawiera **witaminę D3** (cholekalcyferol). Cholekalcyferol zwiększa stężenie wapnia we krwi i pobudza właściwe tworzenie i mineralizację kości. Witamina D3 po doustnym podaniu jest dobrze wchłaniana w jelicie cienkim.

### Wskazania

- profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków,
- leczenie wspomagające osteoporozy u osób dorosłych,
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, będących w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.

Lek może być stosowany w leczeniu niedoboru witaminy D, krzywicy, osteomalacji u pacjentów uprzednio zdiagnozowanych, jako kontynuacja leczenia.



## Sposób użycia

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru (np. krzywica, osteomalacja) u osób dorosłych, młodzieży, dzieci, niemowląt i noworodków (u noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza):

### Zalecane dawkowanie

- **Wcześnieiki:** 1-2 krople (500-1000 IU) na dobę. Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego, dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
- **Noworodki i niemowlęta do ukończenia 12. miesiąca życia:** 1 kropla (500 IU) na dobę.
- **Dzieci w wieku od 1 do 10 lat:** jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest możliwa, 1-2 krople (500-1000 IU) na dobę.
- **Dzieci w wieku od 11 lat, młodzież i osoby dorosłe:** jeśli wystarczająca ekspozycja na słońce nie jest możliwa, 2-4 krople (1000-2000 IU) na dobę.
- **Osoby w wieku podeszłym (powyżej 75 lat):** 4-8 kropli (2000-4000 IU) na dobę.

### Ostrzeżenia

Leku **Juvit D3 MAX** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu,
- jeśli u pacjenta występuje: hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia w surowicy), kamica nerkowa, brak aktywności hydroksylazy cholekalcyferolu w wątrobie i w nerkach lub ciężka niewydolność nerek.

### Skład

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol w ilości 0,5 mg (20 000 IU) w 1 ml roztworu (1 ml roztworu zawiera 40 kropli). / Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.