



Kardio Complex tabletki 30 szt.

Cena: 16,16 zł



Opis słownikowy

Producent	DOMOWA APTECZKA
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

30 szt.

Skład

Monascus purpureus (fermentowany czerwony ryż standaryzowany na 4% monokoliny), substancje wiążące (celuloza, sorbitol), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), substancja glazurująca (hydroksypropolometyloceluloza, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina).

Składniki w maksymalnej porcji dziennej (1 tabletki):

Monakolina K	10 mg	
Tiamina	1,1 mg	100% R
Witamina B6	0,42 mg	30% R
Kwas foliowy	60 µg	30% R
Witamina B12	0,75 µg	30% R

*% Referencyjne Wartości Spożycia



Kardio Complex to suplement diety do stosowania w celu uzupełnienia diety w monakolinę K i witaminy z grupy „B”.

- **Monakolina** - pozyskiwana z *Monascus purpureus* (fermentowanego czerwonego ryżu) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje po spożyciu 10 mg dziennie monakoliny przez ok. 8 tygodni.
- **Tiamina (witamina B1)** - wspomaga prawidłowe funkcje serca.
- **Witamina B6 i B12 oraz foliany (kwas foliowy)** - wpływają na prawidłowy poziom homocysteiny we krwi.
- **Witaminy z grupy „B”** - wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (tiamina, witamina B12).
- **Witamina B6** - pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny, prawidłowym metabolizmie białka oraz glikogenu, wspiera produkcję krwinek czerwonych.
- **Witamina B6 i witamina B12** - przyczyniają się do redukcji zmęczenia i znużenia.

Wskazania

Utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Sposób użycia

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 tabletkę dziennie, po posiłku przez ok. 8 tygodni. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne.

Ostrzeżenia

Nie stosować u osób poniżej 20 roku życia, kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią i osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu. Osoby przyjmujące leki zawierające statyny oraz inne niektóre leki (w szczególności erytromycynę, ketokonazol, verapamil – inhibitory CYP3A4) oraz osoby z chorobą alkoholową, miopatią, cholestazą, chorobami nerek, schorzeniami wątroby przyjmowanie preparatu powinny konsultować z lekarzem.