

Kidofen max (250 mg/5ml) zawiesina doustna 100ml

Cena: 21,01 zł



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Zawiesina

Opakowanie

Butelka 100ml

Działanie

Kidofen max to lek w formie zawiesiny doustnej o smaku truskawkowym, wykazujący właściwości przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Preparat należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (również w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego).

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (np. bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych)

Dawkowanie

Zalecana dawka

Dawka dobową ibuprofenu wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych.



Wiek/masa ciała dziecka	Dawka jednorazowa	Maksymalna dawka dobowo Dawki podawać co około
3-6 miesięcy / 5-7,6 kg	1 ml (50 mg)	3 razy po 1ml (3 razy po 50 mg)
6-12 miesięcy / 7,7-9 kg	1 ml (50 mg)	3 do 4 razy po 1ml (3 lub 4 razy po 50 mg)
1-3 lat / 10-15 kg	2 ml (100 mg)	3 razy po 3ml (3 razy po 100 mg)
4-6 lat / 16-20 kg	3 ml (150 mg)	3 razy po 3ml (3 razy po 150 mg)
7-9 lat / 21-29 kg	4 ml (200 mg)	3 razy po 4ml (3 razy po 200 mg)
10-12 lat / 30-40 kg	6 ml (300 mg)	3 razy po 6 ml (3 razy po 300 mg)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka w objawowym leczeniu bólu i gorączki: 3 razy po 8 ml w ciągu doby, po ustąpieniu objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie przez lekarza. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki. U osób z niewydolnością nerek ustalając dawkę należy uwzględnić stopień wydolności nerek. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. U osób z wrażliwym żołądkiem zaleca się stosowanie leku podczas posiłku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała poniżej 5 kg.

Ostrzeżenia

Leku nie należy przyjmować:

- jeśli dziecko ma uczulenie na którykolwiek ze składników;
- jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i (lub) dłoni lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (jak np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż Kidofen max może u tych pacjentów wywołać podobne objawy nieporządane;
- jeśli u pacjenta występuje obecnie lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia);
- jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja (przedziurawienie) przewodu pokarmowego; związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i nerek;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie;
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia;
- jeśli występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu;
- u dzieci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Nie wolno przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.



Skład

apteka

Substancją czynną leku jest ibuprofen. 5ml zawiesiny zawiera 250mg ibuprofenu. Pozostałe składniki to: maltitol ciekły (E965), glicerol, sodu chlorek, kwas cytrynowy (E330), sodu cytrynian, sukraloza (E955), posisorbat 80, guma ksantan, sodu benzoesan (E211), aromat truskawkowy (zawiera etanol, glikol propylenowy), woda oczyszczona.