



Lacidofil kapsułki 60 szt. (Iodówka - tylko odbiór osobisty)

Cena: 46,67 zł



Opis słownikowy

Producent	GLENMARK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Kapsułki

Opakowanie

60 szt.

Działanie

Kapsułki **Lacidofil** zawierają szczepy bakterii kwasu mlekowego: *Lactobacillus rhamnosus* R0011, *Lactobacillus helveticus* R0052. Preparat przeciwdziała zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, zapobiega bieguncie podróźnej oraz wspomaga leczenie podczas i po antybiotykoterapii oraz nawracającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

Wskazania

Wspomaganie mikroflory układu trawiennego, zapobieganie biegunkom podróźnym i po antybiotykach.

Sposób użycia

Zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, zapobieganie bieguncie podróźnych:

- Dzieci w wieku poniżej 4 lat - 1 kapsułka na dobę
- Dzieci w wieku od 4 do 12 lat - od 1 do 2 kapsulek na dobę



- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat** - 1 kapsułka trzy razy na dobę

Należy stosować przez min. 10 dni.

Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy:

- **Niemowlęta** - 1 kapsułka na dobę
- **Dzieci w wieku od 1 do 4 lat** - 1 kapsułka dwa razy na dobę
- **Dzieci w wieku od 4 do 12 lat** - 1 kapsułka trzy razy na dobę
- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat** - od 1 do 2 kapsułek trzy razy na dobę

Należy stosować przez min. 14 dni.

Ostrzeżenia

Lacidofil nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników,
- w przypadku potwierdzonej alergii na białko mleka krowiego lub soję,
- przy niedoborze laktozy (typu Lapp) lub sacharozy-izomaltazy,
- w przypadku dziedzicznej nietolerancji galaktozy,
- w zaburzeniach związanych z nietolerancją fruktozy,
- w zespole złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek należy przechowywać w lodówce (2°C- 8°C).

Lek można przechowywać poza lodówką (w temperaturze poniżej 25°C) przez 14 dni. Po tym czasie nieużyty lek należy wyrzucić. Lek przechowywany poza lodówką nie może być ponownie umieszczony w lodówce.

Skład

Jedna kapsułka zawiera 2x10⁹ CFU* bakterii kwasu mlekowego: *Lactobacillus rhamnosus* R0011, *Lactobacillus helveticus* R0052. Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, magnezu stearynian, maltodekstryna, żelatyna.

*CFU- jednostka tworząca kolonię (ang. Colony Forming Unit).