



apteka
w sieci

Lactovaginal kapsułki dopochwowe 28 szt. (Iodówka - tylko odbiór osobisty)

Cena: 73,43 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	28 szt.
Postać	Kapsułki dopochwowe
Producent	IBSS BIOMED
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Kapsułki dopochwowe

Opakowanie

28 szt.

Działanie

Lactovaginal zawiera żywe bakterie kwasu mlekowego szczepu *Lactobacillus rhamnosus* 573. Bakterie te rozkładają obecne w pochwie związki do kwasu mlekowego, utrzymując tym samym odpowiednią kwasowość (pH) pochwy. Kwaśny odczyn pochwy (pH 4,0-4,7) hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych.

Badania wykazały, że stosowanie leku **Lactovaginal** po uprzednim leczeniu stanów zapalnych pochwy lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsistkowymi oraz przeciwgrzybiczymi wpływa na zmniejszenie liczby drobnoustrojów chorobotwórczych, przywrócenie naturalnej równowagi mikrobiologicznej w pochwie oraz normalizację wydzieliny z pochwy.

Wskazania

Lactovaginal przeznaczony jest do stosowania u kobiet i dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie, w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy. Lek zaleca się stosować:



- profilaktycznie,
- w stanach zapalnych narządów rodnych, po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybiczymi lub przeciwrzęsistkowymi,
- przy występowaniu upławów.

Ostrzeżenia

Leku **Lactovaginal** nie należy stosować jeśli pacjentka ma uczulenie na pałeczki Lactobacillus lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, objawiające się np. swędzeniem lub pieczeniem po zastosowaniu leku.

Sposób użycia

Zalecana dawka to od 1 do 2 kapsułek na dobę (jedną rano, a drugą na noc) przez 1 tydzień. W razie potrzeby, leczenie można powtórzyć po skonsultowaniu się z lekarzem. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

U dziewcząt, które rozpoczęły miesiączkowanie. Lek można stosować po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku są żywe bakterie kwasu mlekowego szczepu Lactobacillus rhamnosus 573, około 1010 (w tym nie mniej niż 108 CFU). Pozostałe składniki to: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, mannitol oraz składnik osłonki kapsułki: hypromeloza.