



apteka
w sieci

Lactulose-MIP syrop 1000ml

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 59,07 zł



Opis słownikowy

Producent	MIP Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Syrop

Dawka

(9,75g/15ml)

Opakowanie

Butelka 1000 ml

Skład:

15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy oraz substancje pomocnicze. Informacja dla diabetyków: 15 ml syropu zawiera 0,2 jednostek chlebowych.

Działanie

Preparat Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym, zmniejsza stężenie amoniaku we krwi o około 25 do 50%. Preparat jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialny jest dwucukier, który nie ulega trawieniu i wchłanianiu w jelicie cienkim. W jelicie grubym, stanowi pożywkę dla bakterii sacharolitycznych ulega rozpadowi do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu mlekowego i octowego, oraz do metanu i wodoru. Obniżenie pH i działanie osmotyczne jest bodźcem do przyspieszenia perystaltyki jelit. Preparat zmniejsza ponadto wchłanianie jonów amonowych i innych toksycznych związków azotu. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia leku w



Objawowe leczenie przewlekłych zaparć. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Ostrzeżenia

Początkowo, bardzo często mogą wystąpić: ból brzucha, wzdęcie lub bębnica. Po podaniu dużych dawek obserwowano: nudności, wymioty oraz biegunkę z zaburzeniami równowagi elektrolitowej.

Dawkowanie

Do dawkowania syropu służy dołączona miarka. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania: zaparcia: dorośli: 10 do 15ml syropu (6,5g do 9,75g laktulozy) 1 lub 2 razy na dobę. Dzieci: początkowo 10 do 25ml syropu (6,5g do 16,25g laktulozy) na dobę, przez 2-3 dni. Następnie 5 do 15ml (3,25g do 9,75g laktulozy) na dobę.

Encefalopatia wątrobowa: dawki należy zwiększać stopniowo. Dorośli: początkowo 10 do 15ml syropu (6,5g do 9,75g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć 30 do 45ml (19,5 do 29,25g laktulozy) 3 lub 4 razy na dobę. Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalął luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit. Zapalenie przewodu pokarmowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Dziedziczna nietolerancja fruktozy. Zaburzenia w wydzielaniu laktazy. Galaktozemia. Zaburzenia wchłaniania jelitowego glukozy oraz galaktozy.