

## Lakcid Forte kapsułki twarde x 10 szt.

Cena: 35,88 zł



### Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Kapsułki

#### Opakowanie

1 op. 10 kapsułek

#### Skład

Minimum 10 mld CFU pałeczek *Lactobacillus rhamnosus*: •Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Pen - 40 % •Szczep *Lactobacillus rhamnosus* E/N - 40 % •Szczep *Lactobacillus rhamnosus* Oxy - 20 % •Pałeczki odporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycylinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę. •CFU - jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit). •Substancje pomocnicze zawartość kapsułki: mleko odtłuszczone, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu (E 171), hydroksypropylometyloceluloza, kompleks miedziowy chlorofilu (E 141), tlenek żelaza żółty (E 172)

#### Działanie

W jego skład wchodzi bakterie ze szczepu *Lactobacillus rhamnosus*, który korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie organizmu. Przede wszystkim sprawia, że unormowana zostaje mikroflora bakteryjna przewodu pokarmowego (która uległa wyjąłowieniu np. w czasie kuracji antybiotykowej). Bakterie te są niewrażliwe na wpływ soli kwasów żółciowych. Dodatkowo sprawia, że powstaje środowisko niekorzystne dla rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.



## Wskazania

Poantybiotykowe zapalenie jelit, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężni, zapobieganie bieguncce podróżnych, leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

## Sposób użycia

Dzieci i młodzież o ile lekarz nie zaleci inaczej, – 2 razy dziennie jedna dawka (zawartość kapsułki lub cała kapsułka). Dorośli o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 razy dziennie jedna dawka (zawartość kapsułki lub cała kapsułka). Zawartość kapsułki (proszek) należy rozpuścić w około 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dokładnie wymieszać. Taki sposób podania leku szczególnie zalecany jest dla niemowląt i dzieci. Dla dorosłych poleca się połknąć w całości