




# LICERINN płyn likwidujący wszy i gnidy + grzebień 50ml

Cena: 20,15 zł



## Opis słownikowy

Producent	ICB PHARMA SP.J.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Płyn

### Opakowanie

50ml

### Działanie

**LICERINN** jest zestawem przeznaczonym do leczenia wszawicy. Skutecznie eliminuje wszystkie stadia rozwojowe wszy, a dołączony do zestawu grzebień ułatwia usuwanie martwych gnid i wszy. Wyrób medyczny posiada unikalną formułę opartą na fizykalnym sposobie działania. Preparat szczelnie pokrywa narządy oddechowe wszy i gnid, dzięki czemu przy ich eliminacji nie ma możliwości wykształcenia się odporności pasożytów.

### Wskazania

Leczenie wszawicy.

### Sposób użycia

1. Płyn Licerinn nałożyć na suche włosy, rozpoczynając od czubka głowy, po czym rozprowadzić wyrób dokładnie na całej ich długości, zwracając uwagę na miejsca przy samej skórze, za uszami i na karku tak aby produkt pokrył równomiernie włosy i skórę głowy.
2. Nałożyć na głowę czepek lub folię ochronną i pozostawić na 15 minut.



3. Czepek zdjąć, włosy delikatnie osłukać i umyć szamponem.

4. W celu usunięcia martwych wszy i gniid, należy przeczesać włosy dołączonym grzebieniem.

W przypadku długich i gęstych włosów, należy podzielić je na części przed nałożeniem płynu, a także w momencie wyczesywania martwych wszy ich jaj. Należy starannie wyczesać każde pasemko włosów, zaczynając od samego czubka głowy.

Zabieg zaleca się powtórzyć po upływie 7 dni. To ważny punkt terapii, gdyż pozwala to uniknąć ponownego zainfekowania głowy i włosów.

#### Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować:

- u dzieci poniżej 2. roku życia
- na skórę podrażnioną lub uszkodzoną
- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu

Należy bezwzględnie unikać kontaktu wyrobu z oczami i błonami śluzowymi ust i nosa. W przypadku dostania się wyrobu do oczu, błon śluzowych ust lub nosa należy przemyć te miejsca dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia niepożądanych działań, należy niezwłocznie przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Skład

Cyklometikon, polisorbat 80, mirystynian izopropylu.