



apteka
w sieci

Lioton 1000 żel 8,5 mg 1000j.m. 100g

Cena: 50,50 zł



Opis słownikowy

Producent	BERLIN CHEMIE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Producent:

MENARINI

Postać leku:

Żel

Dawka:

1000j.m.

Opakowanie:

Tuba 100 g


Skład:

Heparyna sodowa (1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 j.m.) sodowej heparyny) substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona

Działanie:

Preparat do stosowania zewnętrznego wykazujący miejscowe działanie przeciwzakrzepowe. Heparyna zapobiega powstawaniu powierzchniowych zakrzepów i ułatwia rozpuszczanie już istniejących, a także przyspiesza wchłanianie krwiaków i nacieków. Hamuje powierzchniowe procesy zapalne przez unieczynnianie enzymów, m.in. hialuronidazy i fosfatazy. Normalizuje lepkość krwi, przepuszczalność naczyń i zdolność wiązania wody przez międzykomórkową tkankę podskórną. Działa długotrwale, łagodzi ból i uczucie napięcia, poprawia metabolizm podskórnej tkanki łącznej, skracając czas choroby.

Wskazania:



Wspomagająco w chorobach żył powierzchniowych, w zapaleniu żył (także po wlewach kroplowych lub wstrzyknięciach), zakrzepowym oraz żylakowatym zapaleniu żył, w zespole objawów żylakowości, żylakach kończyn dolnych, także w krwiakach, stłuczeniach, obrzękach oraz w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub parabeny. Nie stosować na otwarte lub zakażone rany, błony śluzowe, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia oraz w przypadku krwawień. Dzieci, bezpieczeństwo stosowania nie zostało ustalone.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci: 1-3 razy dziennie nanieść na skórę średnio 3-10 cm żelu, następnie delikatnie wmasować.