



apteka  
w sieci

## Loperamide Aurovitas 2mg kapsułki 20 szt.

Cena: 8,28 zł



### Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	20 szt.
Postać	kapsułki twarde
Producent	AUROVITAS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Loperamidi hydrochloridum

### Opis produktu

#### Postać

Kapsułki

#### Opakowanie

20 szt.

#### Działanie

Lek zawiera loperamid, który pomaga zatrzymać biegunkę, powodując że stolec jest bardziej zwarty i zmniejsza się częstotliwość wypróżnień.

#### Wskazania

Leczenie nagłych krótkotrwałych (ostrych) ataków biegunki u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

#### Sposób użycia

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Po pierwszym luźnym stolcu (wypróżnieniu) należy zażyć 2 kapsułki i popić wodą. Po każdym kolejnym luźnym stolcu należy zażyć 1 kapsułkę.



Leku nie należy stosować dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po 2 dniach stosowania pacjent nie odczuwa poprawy lub czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

#### Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- Jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek ze składników preparatu.
- U dzieci poniżej 12. roku życia.
- Jeśli pacjent ma rozdęcia okrężnicy, silne rozdęcie okrężnicy i niedrożność jelit.
- Jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit, która powoduje "wyciek" wodnistych stolców.
- Jeśli u pacjenta występuje uporczywy ból brzucha, wysoka temperatura i/lub stolce zawierające śluz i/lub krem. Objawy te mogą być spowodowane zatruciem pokarmowym lub infekcją lub zapaleniem jelita grubego.
- Jeśli pacjent występuje bakteryjne zapalenie jelita grubego i/lub jelita cienkiego wywołane przez organizmy inwazyjne, w tym Salmonella, Shigella i Campylobacter.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane stosowaniem niektórych antybiotyków).
- We wszystkich przypadkach, w których normalne wypróżnienia nie powinny być tłumione.

#### Skład

Substancją czynną jest loperamidu chlorowodorek. Każda kapsułka, twarda zawiera 2mg loperamidu chlorowodoru.

Pozostałe substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian. Osłonka kapsułki - korpus i wieczko: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda. Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172).