



Luminastil 50 mg tabletki 10 szt.

Cena: 14,33 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Dawka | 50 mg |
| Opakowanie | 10 szt. |
| Producent | AFLOFARM |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | Diphenhydramini hydrochloridum |

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Lek **Luminastil** zawiera substancję czynną difenhydraminy chlorowodorek, należącą do leków przeciwhistaminowych o działaniu nasennym i uspokajającym. **Difenhydramina** powoduje skrócenie czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz zwiększa głębokość i jakość snu.

Wskazania

Krótkotrwałe stosowanie w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych. Sporadycznie występująca bezsenność może pojawiać się szczególnie w przypadku występowania trudności w zasypianiu, częstych przebudzeń nocnych, wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Leku nie należy stosować w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu.

Okres leczenia powinien być jak najkrótszy. **Leku nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem.** Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób użycia



Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka:

- **Dorośli** - w razie potrzeby, przyjmować 1 tabletkę na 20 minut przed snem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki i częstości dawkowania. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej leku: 1 tabletkę na dobę. Nie należy przyjmować dodatkowej tabletki po przebudzeniu w nocy. **Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.**

Ostrzeżenia

Leku **Luminastil** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na difenhydraminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma bliznowaciejący wrzód żołądka (uszkodzenie błony śluzowej żołądka lub początkowego odcinka jelita);
- jeśli pacjent ma niedrożność żołądka lub jelit (spowodowany np. wrzodem trawiennym);
- jeśli pacjent ma guz nadnercza (znany jako guz chromochłonny);
- jeśli pacjent ma problemy z sercem zwane wydłużeniem odstępu QT;
- jeśli pacjent ma chorobę układu sercowo-naczyniowego lub niskie tętno;
- jeśli pacjent ma małe stężenie elektrolitów we krwi (np. zmniejszone stężenie potasu lub magnezu);
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca; jeśli w najbliższej rodzinie pacjenta wystąpił nagły zgon z powodu schorzeń serca.

Skład

Substancją czynną leku jest difenhydraminy chlorowodorek. Każda tabletkę zawiera 50mg difenhydraminy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrorystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezy stearynian.