



Maglek B6 tabletki 50 szt.



Cena: 13,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 szt.
Postać	tabletki
Producent	LEKAM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Magnesii lactas, Pyridoxini hydrochloridum

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

50 szt.

Działanie

MAGLEK B6 zawiera wysokiej jakości **magnez** w postaci soli, która wykazuje się wysoką przyswajalnością i wchłanianością. Niedobór magnezy może powodować nadpobudliwość, problemy z koncentracją i zasypianiem, zwiększoną podatność na stres i zaburzenia pracy mięśni. Objawami niedoboru magnezu jest również zwiększone ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzenie rytmu pracy serca.

MAGLEK B6 zawiera również **witaminę B6**, której niedobór objawia się nudnościami, stanem zapalnym, wymiotami, jak również uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną.

Wskazania

MAGLEK B6 wskazany jest profilaktycznie do stosowania:

- w sytuacjach powodujących niedobory magnezu: stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego, błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających, spożywanie dużej ilości kawy, nałogowe



palenie tytoniu i spożywanie alkoholu; długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych u niektórych preparatów moczopędnych oraz diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii, choroby przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłanianie);

- w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca

MAGLEK B6 wskazany jest wspomagająco (po konsultacji z lekarzem) jako uzupełnienie leczenia:

- chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca;
- atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn;
- w stanach depresji nerwowej;
- podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia:

- w **profilaktyce** - 1 do 2 tabletki na dobę
- w **pozostałych wskazaniach** - według zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- hipermagnezemii o różnej etiologii,
- ciężkiej niewydolności nerek,
- bloku przedsionkowo-komorowego serca,
- znacznego niedociśnięcia tętniczego, myasthenia gravis, podczas biegunki.

Leku **MAGLEK B6** nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: magnezu mleczan, w ilości 500 mg (51 mg Mg 2+) i pirydoksyny chlorowodorek (wit. B6), w ilości 5 mg - w jednej tabletkce. / Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.