



apteka
w sieci

Magne B6 Forte tabletki powlekane 100 szt.

Cena: 43,80 zł



Opis słownikowy

Producent	SANOFI AVENTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

100 szt.

Działanie

Magnez jest kationem stanowiącym niezbędny element w prawidłowym przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczy mięśnia sercowego, wspomagając stan pobudliwości nerwowo-mięśniowego. **Magnez** jest tylko częściowo wchłaniany z przewodu pokarmowego, przede wszystkim w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach.

Niedobór **magnezu** może powodować następujące objawy:

- drażliwość, nerwowość, łagodny lęk, wahania nastroju, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu,
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca),
- kurcze mięśni, drganie powiek, mrowienie.

Uzupełnienie magnezu może łagodzić te objawy.



Wskazania

Magne B6 Forte wskazany jest w celu uzupełnienia niedoboru magnezu, które mogą wystąpić w różnych sytuacjach fizjologicznych (np. niedostateczna podaż magnezu, po intensywnych wysiłku fizycznych albo w przypadku przewlekłego stresu lub braku snu) jak i patologicznych (np. wrodzony zespół zaburzeń wchłaniania).

Sposób użycia

- **Dorośli** - od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.
- **Dzieci od 6. roku życia i starsze (o masie ciała około 20 kg)** - od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę tzn. 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Ostrzeżenia

Leku Magne B6 Forte nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.)
- jednoczesne stosowanie lewodopy

Skład

Substancjami czynnymi leku są: jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) 100 mg, pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 10 mg. **Substancje pomocnicze** to: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian. **Skład otoczeki:** hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.