



Magvit B6 tabletki 50 szt.

apteka
w sieci

Cena: 11,50 zł



Opis słownikowy

Producent	ANGELINI PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

50 tabletek

Skład

1 tabletkę zawiera:

- 48 mg jonów magnezu w postaci mleczanu dwuwodnego
- 5 mg pirydoksyny chlorowodoru (witamina B6)

Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian, kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek(E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Działanie

MagvitB6 to lek, który zawiera sól magnezową kwasu mlekowego oraz witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Magnez - reguluje przepływ jonów w komórce –zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.



Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca.

Witamina B6 - ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu.

Awitaminoza B6 przejawiać się stanem zapalnym skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz niedokrwistością wynikającą z niedoboru hemoglobiny

Wskazania

Zaleca się stosowania **Magvit B6**:

Profilaktycznie

W stanach zmęczenie fizycznego i psychicznego, w sytuacjach stresowych, depresji, zaburzeniach snu, bólach mięśni, nadpobudliwości nerwowej, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.

Uzupełniająco

Przy długotrwałym stosowaniu leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych, niektórych preparatów moczopędnych, w przypadku diurezy osmotycznej u cukrzyków, w przypadku hipomagnezemu wywołanej nałogowym paleniem i spożywaniem alkoholu

Wspomagająco

Uzupełnienie leczenia chorób serca i układu krążenia (takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca), w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, w stanach depresji nerwowej, jak również podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy

Sposób użycia

Profilaktycznie:

Dorośli i dzieci od 12. roku życia (młodzież): 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę

Młodsze dzieci na zalecenie lekarza.

Leczniczco

Wyłącznie z przepisu lekarza. Lek należy popić wodą

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B₆, blok przedsionkowo-komorowy, myasthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.