



apteka
w sieci

Mamalac krople dla niemowląt 15 ml



Cena: 32,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	Krople
Producent	VORWARTS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Krople

Opakowanie

15ml

Działanie

Mamalac zawiera wysoce aktywny enzym laktazę pochodzenia roślinnego, utrzymujący stabilność w kwaśnym środowisku żołądka i zachowujący swoją aktywność przy wysokich wahaniamiach pH. Z 15 ml kropli można przygotować 37 porcji stosując 8 kropli na jedną porcję.

Wskazania

Kolka niemowlęca.

Sposób użycia

Dla niemowląt w wieku	Ilość mleka lub mleka modyfikowanego na jeden posiłek (ml)	Liczna kropli* na jeden posiłek
0-2 tygodni życia	60-90	5
3-4 tygodni życia	120	6
1-2 miesiące życia	150	8



3-4 miesiące życia

180

9

*1 kropla zawiera 150 jednostek FCC** laktazy.

**Food Chemical Codex - kodeks substancji chemicznych w żywności.

Zalecane spożycie podane w tabeli jest przybliżone. W wyjątkowych przypadkach, gdy niemowlę odczuwa znaczny dyskomfort, podawanie Mamalac można zwiększyć zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stosować po konsultacji z lekarzem!

Mamalac powinno być stosowane podczas każdego karmienia niemowlęcia w ciągu pierwszych 3-4 miesięcy życia. Po tym okresie enzym laktaza zwykle zaczyna być wytwarzana w wystarczającej ilości przez organizm i możliwe jest stopniowe zaprzestanie stosowania Mamalac.

Jak prawidłowo stosować Mamalac

Podczas karmienia piersią:

- postępując zgodnie z tabelą dawkowania, wlać odpowiednią ilość kropli na uprzednio wysterylizowaną łyżkę i podawać dziecku przed każdym karmieniem.

Podczas karmienia mlekiem modyfikowanym:

- dokładnie przygotować mleko modyfikowane zgodnie z instrukcjami producenta,
- postępować zgodnie z tabelą dawkowania, dodać krople Mamalac do mleka lub mleka modyfikowanego.

Uwagi

Enzym laktaza zawarty w suplemencie diety Mamalac ulega zniszczeniu w wyniku działania wysokiej temperatury, dlatego należy dodawać Mamalac do gorącego lub bardzo zimnego mleka lub mleka modyfikowanego. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania Mamalac. Jeśli kolka jelitowa nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Skład

Laktaza, glicerol. 1ml (20 kropli) zawiera 3000 jednostek FCC* laktazy.

*substancji chemicznych w żywności.