


Cena: 12,94 zł

Opis słownikowy

Producent	PHARMASWISS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Postać

Maść

Opakowanie

Tubka 5g

Skład

Na 1 g maści MaxiBiotic składa się 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycinisulfas), 5000 IU polimyksyny B siarczanu (PolymyxiniBsulfas) i 400 IU bacytracyny cynkowej (Bacitracinumzincum). Maść ma w swoim składzie także białą wazelinę, czyli substancję pomocniczą.

Działanie

MaxiBiotic to maść zawierająca 3 antybiotyki – neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę. Lek ten ma działanie antibakteryjne i zwalcza chorobotwórcze mikroorganizmy przyczyniające się do powstawania zakażeń skóry.

MaxiBiotic przyspiesza gojenie się drobnych ran będących skutkiem zarówno urazów mechanicznych, jak i oparzeń. Przynosi także ukojenie w przypadku ukąszeń i pogryzień przez zwierzęta.

MaxiBiotic to lek:

- bez recepty,



- zawierający 3 aktywne składniki,
- przyspieszający gojenie się ran,
- o działaniu nawilżającym i przeciwbakteryjnym.

Wskazania

- drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia),
- oparzenia,
- owrzodzenia skóry.

Sposób użycia

MaxiBiotic należy stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na ulotce bądź wskazaniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zgłoszenie się do specjalisty.

Maść MaxiBiotic to lek przeznaczony do stosowania naskórnego. Jego niewielką ilość należy aplikować na oczyszczoną skórę 2-5 razy dziennie. Posmarowane maścią miejsce można pozostawić odsłonięte lub zabezpieczyć opatrunkiem z gazy.

Maksymalna długość stosowania – 7 dni. Ponowne stosowanie leku możliwe po upływie 3 miesięcy.

Dzieci i młodzież:

Maści nie należy stosować u dzieci w wieku od 0 do 12 lat.

Przeciwwskazania do stosowania maści MaxiBiotic:

- uczulenie na któryś ze składników,
- zaburzenia słuchu,
- głębokie rany klute, ciężkie oparzenia i duże uszkodzenia skóry,
- sączące się zmiany skórne – występuje zbyt duże ryzyko przeniknięcia substancji czynnych do krwi, co może być szkodliwe dla słuchu, nerek bądź wywołać inne niepożądane działania ogólnoustrojowe,
- leku nie wolno stosować do oczu.

Zbyt długie stosowanie maści MaxiBiotic może skutkować namnażaniem się grzybów i innych drobnoustrojów odpornych na działanie leku. Reakcja ta jest typowa dla leków z antybiotykiem.