

Maxibiotic maść w saszetkach x 10 szt.

Cena: 17,37 zł



Opis słownikowy

Producent	PHARMASVISS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Maść w saszetkach

Opakowanie

1 opakowanie 10 saszetek po 1g

Skład

1 g maści (pojedyncza saszетка) MaxiBiotic zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (*Neomycinisulfas*), 5000 IU polimyksyny B siarczanu (*PolymyxiniBulfas*), 400 IU bacytracyny cynkowej (*Bacitracinumzincum*) oraz substancję pomocniczą – wazelinę białą.

Działanie

MaxiBiotic w saszetkach to lek mający w składzie 3 antybiotyki – neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę, które w połączeniu ze sobą wykazują silne działanie przeciwbakteryjne. Skutecznie zwalczają chorobotwórcze drobnoustroje, zapobiegając zakażeniom skóry. Maść MaxiBiotic przynosi ukojenie w przypadku niewielkich ran, spowodowanych np. otarciami, zadrapaniami czy skaleczeniami. Pomocna jest również w przypadku podrażnień po ukąszeniach czy pogryzieniach przez zwierzęta. MaxiBiotic łagodzi także skutki oparzeń.

Maść w saszetkach można kupić bez recepty. Ponieważ zawiera 3 aktywne składniki, wykazuje właściwości takie jak:

- szybsze gojenie się ran,
- dogłębne nawilżenie uszkodzonego naskórka,



- działanie przeciwbakteryjne,
- zapobieganie bliznom.

Dzięki temu, że maść MaxiBiotic zamknięta jest w małej saszetce o pojemności 1 g, można nosić ją zawsze przy sobie lub bez problemu przechowywać w apteczce.

Wskazania do stosowania maści MaxiBiotic to:

- drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia),
- oparzenia,
- owrzodzenia skóry.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem leku MaxiBiotic prosimy o dokładne zapoznanie się z receptą. Lek należy przyjmować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w ulotce bądź wedle zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zwrócenie się po poradę do tych specjalistów.

Aplikacja:

- niewielka ilość na oczyszczoną skórę,
- 2-5 razy na dobę,
- posmarowane miejsce na skórze można przykryć gazą lub pozostawić nieosłonięte.

MaxiBiotic można stosować maksymalnie przez 7 dni. Ponowne leczenie przy użyciu maści możliwe jest po upływie 3 miesięcy.

Leku MaxiBiotic nie można stosować:

- u dzieci 0 -12 lat,
- u osób z zaburzeniami słuchu,
- u pacjentów uczulonych na któryś ze składników leku,
- na głębokie rany kłute i ciężkie oparzenia,
- na wielkopowierzchniowe uszkodzenia skóry,
- na sączące się rany – ryzyko niepożądanych skutków ubocznych, wchłonięcie się substancji czynnych do krwi może działać szkodliwie na narządy słuchu i nerki,
- do oczu.

Ponieważ MaxiBiotic to maść na bazie antybiotyku, jej długotrwałe stosowanie może powodować nadmierne namnażanie odpornych na lek drobnoustrojów, np. grzybów.