



apteka
w sieci

Maxigra Go 25mg tabletki x 4 szt.



Cena: 17,48 zł

Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

1 op. 4 sztuki

Działanie

Lek zawiera substancję czynną - **syldenafil**, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. **Maxigra Go** działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.


Wskazania

Preparat dla mężczyzn. Leczy zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Sposób użycia

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku wynosi 25 mg.



Lek należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy przyjąć w całości, popijając szklanką wody.

Leku **Maxigra Go** nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Lek **Maxigra Go** umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku **Maxigra Go**, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletkę do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Otoczkę: alkohol poliwinylowy; tytanu dwutlenek (E 171); makrogol (MW350); talk; idygotyna, lak (E132).