



apteka  
w sieci

# Maxigra Go 25mg tabletki x 8 szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

Cena: 27,67 zł



## Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Opakowanie

1 op. 8 sztuki

### Działanie

Lek zawiera substancję czynną - **syldenafil**, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. **Maxigra Go** działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.


### Wskazania

Preparat dla mężczyzn. Leczy zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

### Sposób użycia

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku wynosi 25 mg.



Lek należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy przyjąć w całości, popijając szklanką wody.

Leku **Maxigra Go** nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Lek **Maxigra Go** umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku **Maxigra Go**, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

#### **Skład**

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletkę do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Otoczkę: alkohol poliwinylowy; tytanu dwutlenek (E 171); makrogol (MW350); talk; idygotyna, lak (E132).