



# Medixil Feet & Hands Specjalistyczny antyperspirant w sprayu 75 ml



Cena: 39,90 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	75 ml
Postać	spray
Producent	ASPEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Spray

### Opakowanie

75ml

### Działanie

**MEDIXIL Feet & Hands** to specjalistyczny antyperspirant, oparty na formule **MediDry**, która zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed nadmiernym poceniem stóp i dłoni oraz niweluje nieprzyjemny zapach. Preparat skutecznie eliminuje nadmierne pocenie stóp i dłoni, zapewniając ochronę przez minimum 5 dni po jednorazowej aplikacji.

### Właściwości składników aktywnych:

- **Chlorek glinu (Aluminium chloride)** - redukuje ilość wydzielanego potu przez gruczoły potowe na stopach i dłoniach.
- **Gliceryna** - nawilża i regeneruje skórę oraz łagodzi podrażnienia i spierzchnięcia.
- **Chlorek glinu i alkohol** - wykazuje działanie przeciwbakteryjne i redukuje nieprzyjemny zapach.

Specjalistyczny antyperspirant **MEDIXIL Feet & Hands** posiada międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa **Allergy Certified**, który



zapewnia, że ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po jego zastosowaniu jest ograniczone do minimum.

#### Wskazania

Spray do stóp, dłoni i obuwi. Zalecany jest dla osób z normalną skórą ze skłonnością do silnej nadmiernej potliwości.

#### Sposób użycia

Nie należy stosować preparatu na skórę uszkodzoną (np. obtarte stopy lub zadrapania) lub podrażnioną (np. egzema). W przypadku skóry uszkodzonej lub podrażnionej należy odczekać do momentu aż naskórek w pełni się odbuduje. Przed każdym użyciem skóra stóp i dłoni musi być czysta i całkowicie sucha (przed zastosowaniem osuszyć skórę suszarką do włosów).

1. **MEDIXIL Feet & Hands** jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na podeszwach stóp i wewnętrznych stronach dłoni.
2. Stosowanie **MEDIXIL** Spray jest bardzo łatwe i wygodne. Należy nakierować wylot atomizera w miejsce stosowania i spryskać podeszwy stóp lub wnętrza dłoni według potrzeby.
3. Rozpoczynając stosowanie antyperspirantu **MEDIXIL** należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać kiedy gruczoły potowe są najmniej aktywne) na czystą, całkowicie suchą nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę.
4. Cienką warstwę preparatu rozprowadzić na podeszwach stóp lub wewnętrznych stronach dłoni, a jeśli to konieczne również w skórę palców i pomiędzy nimi. Następnie w celu uzyskania maksymalnej ochrony preparat można delikatnie wmasować w skórę.
5. Po aplikacji należy odczekać do momentu aż preparat dobrze się wchłonie i skóra będzie całkowicie sucha.
6. Rano należy zmyć pozostałość preparatu używając wody z mydłem.
7. Nie stosować ponownie rano lub po każdym myciu ciała, gdyż efekt działania preparatu utrzymuje się przez kilka dni od momentu użycia - zarówno w ciągu dnia jak i nocy.

#### Uwagi

Jeśli używać antyperspirantu **MEDIXIL** po raz pierwszy należy mieć na uwadze, że skóra musi przyzwyczać się do działania preparatu. W tym okresie może sporadycznie wystąpić swędzenie lub podrażnienie skóry pod pachami. Rozpoczynając stosowanie należy nakładać preparat co drugi dzień na noc przed snem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy wydłużyć ilość dni pomiędzy każdą aplikacją według własnego uznania z uwzględnieniem reakcji skóry na ewentualne podrażnienia.

Kiedy nastąpi zauważalne zmniejszenie intensywności pocenia (zazwyczaj po okresie od 1 do 2 tygodni) należy zacząć stosować preparat co trzecią noc tak często jak zaistnieje potrzeba. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry celem jego złagodzenia, zaleca się użycie organicznego olejku ze słodkich migdałów po każdej aplikacji preparatu. Jeżeli podrażnienie skóry nie ustąpi po 3 lub 3 aplikacjach należy przerwać stosowanie preparatu.

#### Ostrzeżenia

Nie należy stosować antyperspirantu **MEDIXIL** na swędzącą, zaczerwienioną, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Pieczenie lub swędzenie skóry po użyciu preparatu może wystąpić jeśli:

- skóra pod pachami nie była całkowicie czysta lub sucha,
- skóra pod pachami była podrażniona lub uszkodzona,
- zastosowano zbyt dużo produktu lub po aplikacji preparat nie wchłonął się całkowicie w skórę.

Bezpośrednio po aplikacji należy unikać zakładania odzieży. Poczekać do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia preparatu na skórze. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Unikać kontaktu preparatu z biżuterią i powierzchniami metalowymi. W sporadycznych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.



Przechowywać

Przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Skład

Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Glycerin.