



Medixil Strong specjalistyczny antyperspirant roll-on 30 ml

Cena: 30,70 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Opakowanie | 30 ml |
| Producent | ASPEN DISTRIBUTION SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |

Opis produktu

Postać

Antyperspirant

Opakowanie

Pojemnik roll-on 30 ml

Działanie

MEDIXIL jest linią specjalistycznych antyperspirantów opracowanych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem. **MEDIXIL Strong** Antyperspirant zapewnia uczucie komfortu i świeżość przez okres 3 do 5 dni po jednorazowym zastosowaniu produktu.

Wskazania

MEDIXIL Strong polecany jest dla osób o normalnej skórze, z silnym i uciążliwym problemem nadmiernej potliwości.

Sposób użycia

Nie należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu / depilacji włosów na skórę uszkodzoną, podrażnioną (np. egzema). W przypadku uszkodzonej lub podrażnionej skóry, należy odczekać do momentu aż naskórek w pełni się zregeneruje. Przed każdym użyciem skóra pachami musi być czysta i całkowicie sucha.

1. Ostrzeżenia **MEDIXIL** jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę pod pachami. Rozpoczynając stosowanie



antyperspirantów MEDIXIL należy nałożyć preparat na noc (przed położeniem się spać kiedy gruczoły potowe są najmniej aktywne) na czystą, całkowicie suchą, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę.

2. Cienką warstwę preparatu nałożyć na skórę pod pachami (2 obroty kulki ruchem w górę i 2 obroty kulki ruchem w dół).
3. Po aplikacji należy odczekać do momentu aż preparat całkowicie się wchłonie i skóra będzie sucha.
4. Rano należy zmyć pozostałość preparatu używając wody z mydłem.
5. Nie stosować ponownie rano lub po każdym myciu ciała, gdyż efekt działania preparatu utrzymuje się przez kilka dni od momentu użycia - zarówno w ciągu dnia i nocy.
6. Po każdym użyciu należy dobrze zakręcić buteleczkę aby zapobiec wyciekaniu produktu.

Uwagi

Jeśli używać antyperspirantu **MEDIXIL** po raz pierwszy należy mieć na uwadze, że skóra musi przyzwyczać się do działania preparatu. W tym okresie może sporadycznie wystąpić swędzenie lub podrażnienie skóry pod pachami. Rozpoczynając stosowanie należy nakładać preparat co drugi dzień na noc przed snem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy wydłużyć ilość dni pomiędzy każdą aplikacją według własnego uznania z uwzględnieniem reakcji skóry na ewentualne podrażnienia.

Kiedy nastąpi zauważalne zmniejszenie intensywności pocenia (zazwyczaj po okresie od 1 do 2 tygodni) należy zacząć stosować preparat co trzecią noc tak często jak zaistnieje potrzeba. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry celem jego złagodzenia, zaleca się użycie organicznego olejku ze słodkich migdałów po każdej aplikacji preparatu. Jeżeli podrażnienie skóry nie ustąpi po 3 lub 3 aplikacjach należy przerwać stosowanie preparatu.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować antyperspirantu **MEDIXIL** na swędzącą, zaczerwienioną, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Pieczenie lub swędzenie skóry po użyciu preparatu może wystąpić jeśli:

- skóra pod pachami nie była całkowicie czysta lub sucha,
- skóra pod pachami była podrażniona lub uszkodzona,
- zastosowano zbyt dużo produktu lub po aplikacji preparat nie wchłonął się całkowicie w skórę.

Bezpośrednio po aplikacji należy unikać zakładania odzieży. Poczekać do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia preparatu na skórze. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Unikać kontaktu preparatu z biżuterią i powierzchniami metalowymi. W sporadycznych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.

Przechowywać

Przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład

Aqua, Alcohol denat., Aluminum Chloride, Hydroxyethylcellulose.