



apteka
w sieci

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel 100 g

Cena: 26,07 zł



Opis słownikowy

Dawka	20 mg/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Diclofenacum natricum

Opis produktu

Postać

Żel

Opakowanie

Tubka 100g

Działanie

Lek **Mel Max Actigel** zawiera substancję czynną - **diklofenak**, wykazującą miejscowe działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Żel przynosi uczucie ulgi w bólu, a także zmniejsza stan zapalny i obrzęki w okolicach mięśni i stawów.

Wskazania

Żel **Mel Max Actigel** wskazany jest do miejscowego leczenia:

(u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14. roku życia):

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, więzadeł i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń),
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich, takich jak: zapalenie ścięgna, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe,
- bólu pleców.



(u dorosłych powyżej 18. roku życia):

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Sposób użycia

Produkt przeznaczony jest do stosowania na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

Lek wykazuje działanie przeciwbólne do 12 godzin. Należy go stosować 2 razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem) na bolące miejsca.

Sposób stosowania:

Należy delikatnie wcierać niewielką ilość żelu w bolące lub spuchnięte miejsca. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo; wystarczająca jest ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to one są leczonym miejscem.

Długość stosowania leku:

- **dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:** 14 dni w przypadku nadwyrężenia mięśni i stawów oraz zapalenia ścięgien,
- **dorośli (powyżej 18 lat):** 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia

Leku **Mel Max Actigel** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku pojawienia się objawów reakcji alergicznej, wywołanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, takich jak: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),
- w trzecim trymestrze ciąży,
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 20mg diklofenaku sodowego. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła, kokozylokaprylokapronian, kopolimer akryloildimetylotaurynianu amonu i N-winylopirolidonu, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu trioleinian, kompozycja zapachowa Dovena KD1710/L (zawiera między innymi: aldehyd heksylocynamonowy, alkohol benzylový, benzoesan benzylu, cytronellol, eugenol, kumarynę, linalol, salicylan benzylu oraz 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on), woda oczyszczona.