



MELILAX Mikrowlewka dla dzieci 6 szt.

Cena: 31,37 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Producent | ABOCA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Postać

Mikrowlewka

Opakowanie

1 op. 6 mikrowlewek a 5g

Skład

Substancje czynne: 73,2%: Promelaxin aktywny kompleks miodów i polisacharydów z aloesu i ślazu dzikiego; substancje pomocnicze.

Działanie

Melilax jest innowacyjną mikrowlewką na bazie miodu, która łączy zrównoważone działanie usuwające, ochronne i łagodzące błonę śluzową odbytu, pomagająca w walce z uciążliwościami, podrażnieniami i stanem zapalnym, towarzyszącym zaparciom. Podwójne działanie Melilax uzyskiwane jest dzięki PROMELAXIN, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o frakcję polisacharydową z aloesu i ślazu dzikiego. Melilax Pediatric ma działanie wydalające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację. Ponadto Melilax Pediatric, dzięki swym cechom przypominającym śluz i dzięki swej lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas przechodzenia stolca; odgrywając rolę nawilzacza, podobną do śluzu fizjologicznego. Te szczególne właściwości, połączone z działaniem antyoksydacyjnym, nadają produktowi właściwości ochronne i łagodzące błonę śluzową, zapewniając pośrednie działanie przeciwzapalne.

Wskazania

Do leczenia zaparc u dzieci i niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w przypadku okrężnicy drażliwej), szczelin, hemoroidów. Produkt oczyszcza jelito i zmniejsza uciążliwość, podrażnienia i stan zapalny towarzyszący zaparciom.

Sposób użycia



niemowlęta od urodzenia do 1. roku życia: połowa mikrowlewki 5g; - dzieci od 1. do 3. lat: 1 mikrowlewka 5g; - dzieci od 3. do 12. lat: 1 mikrowlewka 5g. W przypadku uporczywych zaparć stosować 2 dawki jednocześnie. Nałożyć kilka kropel produktu wokół odbytu i wprowadzić delikatnie wlewkę do odbytu. cisnąć di końca mikrowlewkę i następnie trzymać ją wciśniętą do momentu całkowitego wyciągnięcia wlewiki, aby uniknąć zasysania produktu.

Uwaga

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden ze składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń. Mikrowlewka jest jednorazowa dlatego nie może być ponownie użyta, gdy zużyje się tylko połowę, jak w przypadku niemowląt.