



apteka
w sieci

Metafen rozkurczowy 40mg, tabletki x 20 szt.

Cena: 9,91 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	5 dni
Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

20 szt.

Działanie

Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie rozkurczowe (spazmolityczne) na mięśnie gładkie. Jego działanie spazmolityczne wiąże się z bezpośrednim wpływem na mięśniówkę gładką i jest niezależne od rodzaju unerwienia.

Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia.

Wskazania

- Stany skurczowe mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego.
- Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.



Wspomagająco: **apteka** w sieci

- W stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit.
- W bolesnym miesiączkowaniu.

Sposób użycia

- **Dorośli:** 120mg do 240mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240mg.

Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. W przypadku konieczności zastosowania leku Metafen rozkurczowych u dzieci:

- Dawka dobową dla **dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** wynosi 80mg, w dawkach podzielonych,
- Dawka dobową dla **dzieci w wieku powyżej 12 lat:** wynosi 160mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletkę zawiera 40mg drotaweryny chlorowodorku. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian.