



apteka
w sieci

Mucoatac 600 mg tabletki musujące 10 szt.

Cena: 11,08 zł



Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	10 szt.
Postać	tabletki musujące
Producent	TACTICA
Rejestracja	
Substancja czynna	Acetylcysteinum

Opis produktu

Postać

Tabletki musujące

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Lek MUCOATAC zawiera substancję czynną - **Acetylocysteinę**, która upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.

Wskazania


MUCOATAC stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Sposób użycia

Nie należy stosować leku MUCOATAC dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zalecana dawka to:

- Dorośli - 1 tabletka musująca leku na dobę.



Rozpuścić tabletkę w połowie szklanki letniej wody. Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia. Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów. Leczenie stanów ostrych nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Uwaga: ostatnia dawka leku powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.

Ostrzeżenia

Leku **MUCOATAC** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w stanie astmatycznym;
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat'
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na ilość substancji czynnej.

Skład

Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna tabletkę musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, maltodekstryna kukurydziana, guma arabska, kwas askorbowy (E 300), butylohydroksyanizol (E 320), sacharyna sodowa (E 954).