

MUGGA IKARYDYNA 20% spray przeciw kleszczom 75ml



Cena: 29,37 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	75 ml
Postać	spray
Producent	JAICO RDP
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

Pojemnik 75ml

Działanie

Produkt **MUGGA** w postaci płynu przeznaczony jest do odstraszenia kleszczy. Stosowany jest na skórę i ubrania, zapewniając długotrwałą ochronę - nawet do 8 godzin. Produkt zalecany jest do stosowania w rejonach, gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia groźnych chorób przenoszonych przez kleszcze jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Płyn nie barwi ubrań i wydziela przyjemny zapach.

Wskazania

Produkt stosowany jest w celu odstraszenia kleszczy. Zalecany jest dla osób pracujących w terenie: ogrodników, rolników, wędkarzy, myśliwych, leśników, jak również młodzieży powyżej 18. roku życia uczestniczących w koloniach czy obozach.

Sposób użycia

Produkt stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nanieść na odsłoniętą skórę, omijając okolice oczu i usta. W celu aplikacji na twarz, należy spryskać dłoń, po czy delikatnie rozmasować na skórze. Ręce dokładnie umyć po użyciu.



Nie stosować poniżej 3. roku życia. W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia stosować 1 raz dziennie, a dzieci powyżej 6. roku życia produkt można stosować 2 razy dziennie.

Nie wdychać rozpylonego produktu.

Ostrzeżenia

Ciecz i opary łatwopalne. Produkt działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porad lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Pierwsza pomoc

- W razie dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.
- Po narażeniu drogą oddechową - zapewnić dostęp świeżego powietrza.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry - spłukać skórę obficie wodą, skontaktować się z lekarzem.

Skład

1-Piperidinecarboxylic acid 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester (Icardine (20%) 200 g/L).