



Cena: 21,80 zł



Opis słownikowy

Producent	PLUSPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Kapsułki

Opakowanie

30 kapsulek

Skład

Substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z korzenia witanii ospałej; substancja zagęszczająca - hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwbrylająca - stearynian magnezu; ekstrakt z kory magnolii, cholekalcyferol; D-pantotenan wapnia; cyjanokobalamina; barwnik - dwutlenek tytanu; chlorowodorek pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutaminowy; barwnik - błękit brylantowy FCF.

Ekstrakt z korzenia witanii ospałej - Ashwagandha (withania somnifera)	150 mg
w tym: witanolidy glikozydowe	15 mg
Ekstrakt z kory magnolii (Magnolia officinalis)	40 mg
w tym: magnolol	10 mg
honokiol	10 mg
Kwas pantotenowy	6 mg
Witamina B6	1,4 µg



Kwas foliowy
Witamina D

Witamina B12

apteka
w sieci

200 µg
50 µg
(2000 IU)
2,5 µg

*RWS - referencyjna wartość spożycia

Działanie

Dostarcza organizmowi szereg witamin, minerałów i ekstraktów roślinnych o pożytecznych właściwościach.

- **Witaminy B6, B12, Kwas foliowy** - przyczyniają się do zachowania prawidłowych funkcji psychologicznych
- **Witaminy B6, B12** - pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
- **Kwas foliowy, Witamina D, Witamina B12** - odgrywają rolę w procesie podziału komórek
- **Kwas pantotenowy** - przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników, bierze udział w utrzymaniu prawidłowej sprawności umysłowej

Wskazania

Zalecane osobom dorosłym, chcącym zachować równowagę ciała i umysłu, w przypadku zmęczenia fizycznego i psychicznego, w przypadkach zwiększonego stresu

Sposób użycia

1 kapsułka dziennie. Spożyć podczas posiłku, popijając wodą.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia, suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety, dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.

Nie zaleca się stosowanie u dzieci, u kobiet w ciąży, karmiących piersią, u osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu.