



apteka
w sieci

Myconafine 1% krem 0,01g/1g 15g



Cena: 10,18 zł

Opis słownikowy

Producent	AXXON
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Producent:

AXXON

Postać:

Krem

Dawka:

10 mg/g

Opakowanie:

Tubka 15 g

Skład:

Chlorowodorek terbinafiny 10 mg oraz substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona

Działanie:

Działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów. Lek Myconafine 1% ma postać kremu, zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.

Wskazania:

W miejscowym leczeniu: grzybicy stóp, grzybicy fałdów skórnych, grzybicy tułowia, drożdżycy skóry, łupieżu pstrego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.



Ostrzeżenia:

Sporadycznie występuje zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych kremem (rzadko wymaga przerwania stosowania leczenia). Objawy alergiczne takie jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka (należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem).

Sposób użycia:

Przed użyciem leku, należy umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsce. następnie niewielką ilość kremu nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze i lekko wetrzeć krem. W przypadku stosowania leku na fałdach skórnych, miejsca te można przykryć świeżą i czystą gażą, zwłaszcza używając kremu nocą. Grzybica stóp: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień. Grzybica fałdów skórnych: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień. Grzybica tułowia: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień. Drożdżycza skóry: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień. Łupież pstry: zwykle raz na dobę przez 2 tygodnie.