



apteka
w sieci

Nebutac 3 HIPERTONICZNY 3% roztwór NaCl, ampułki do inhalacji 30 szt.

Cena: 17,90 zł



Opis słownikowy

Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

Ampułka 4ml x 30 szt.

Opis

Roztwór chlorku sodu 3% pobudza usuwanie wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych na skutek osmotycznego działania, na przykład w przypadku mukowiscydozy, rozstrzeni oskrzeli, zapalenia oskrzelików. Preparat przeciwdziała wysuszeniu śluzu oskrzelowego.

Hipertoniczny 3% roztwór NaCl do inhalacji może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi lub ultradźwiękowymi.

Sposób użycia

Zaleca się stosowanie jednej ampułki do inhalacji 2-4 razy dziennie. Oddzielić ampułkę i utworzyć ją przez odkręcenie górnej części. Roztwór wlać do inhalacji do nebulizatora.

Nebulizator należy stosować zgodnie z instrukcją producenta.



Ostrzeżenia

apteka

Produkt wyłącznie do jednorazowego użytku. Stosować wyłącznie do inhalacji. Produkt nie do wstrzykiwań. Przed użyciem sprawdzić czy nie nastąpiło uszkodzenie jednodawkowej ampułki. Nie używać uszkodzonej ampułki. Postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika producenta nebulizatora.

W razie skłonności lub nadwrażliwości nie wolno stosować roztworu do inhalacji bez nadzoru lekarza. Nie mieszać z innymi lekami. Po otwarciu jednodawkowej ampułki nie wolno jej używać ponownie, gdyż preparat nie zawiera konserwantów. Ponownie użycie ampułki może prowadzić do powstania ryzyka podania zanieczyszczonego roztworu.

Skład

Chlorek sodu: 3g. Woda oczyszczona q.s. 100ml. Bez konserwantów.