



apteka
w sieci

Nefrocal tabletki 60 szt.

Cena: 28,44 zł



Opis słownikowy

Producent	LEKAM
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

1 op. 60 tabletek

Skład

Cytrynian potasu, cytrynian magnezu, substancja wypełniająca (celuloza), substancja wypełniająca (hydroksypropylometyloce-luloza), ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego (*Rosmarinus officinalis*), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (*Equisetum arvense*), w tym: krzem - 7%, ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego (*Levisticum officinale*), ekstrakt z liści borówki brusznicy (*Vaccinium vitis-idaea* L.), w tym: arbutyna - 5-7%, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usiecio-wana), barwnik (dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca (talk), trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Działanie

Składniki preparatu poprawiają pracę nerek, zwiększają funkcje wydzielnicze i moczopędne. Ekstrakt z ziela skrzypu polnego *Equisetum arvense* - wspiera wydalnicze funkcje nerek, ekstrakt z liści borówki brusznicy *Vaccinium vitis-idaea* L, potas (w postaci cytrynianu) - pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, magnez (w postaci cytrynianu) - pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, ekstrakt z korzenia lubczyka *Levisticum officinale* - wykazuje działanie moczopędne, dzięki czemu przyczynia się do ułatwienia wydalania wody z organizmu, ekstrakt z liści rozmarynu *Rosmarinus officinalis* - gatunek krzewu należący do rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae* Lindl.) i witamina B6 - wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.



Wskazania

Na układ moczowy, nerki.

Sposób użycia

2 tabletki powlekane dziennie. Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku, najlepiej rano i wieczorem. Popić wodą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.