



apteka
w sieci

Neo-Pancreatinum Forte kapsułki x 50 szt.

Cena: 34,41 zł



Opis słownikowy

Producent	PHARMA SWISS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Kapsułki

Opakowanie

50 szt.

Działanie

Preparat **Neo-Pancreatinum Forte** zawiera trzy leki: proteazę, amylazę i lipazę. Są to białka, które pomagają przetworzyć i strawić jedzenie. Każda kapsułka zawiera peletki odporne na działanie kwasu żołądkowego, dzięki czemu pankreatyna uwalnia się po opuszczeniu żołądka.

Wskazania

Lek **Neo-Pancreatinum Forte** jest stosowany w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o różnej przyczynie, jak:

- przewlekłe zapalenie trzustki,
- mukowiscydoza,
- niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych spowodowana chorobą nowotworową,
- operacja usunięcia trzustki lub żołądka



- **Dorośli** - od 2 do 4 kapsułek do każdego posiłku. Dawkę można zmniejszyć jedynie po konsultacji z lekarzem.
- **Dzieci** - dawka powinna być zawsze ustalona przez lekarza.

Lek należy stosować w czasie posiłku, popijając płynem. Kapsułki należy połykać w całości; nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani trzymać w jamie ustnej, gdyż może to powodować podrażnienie błony śluzowej, a także zmniejszyć skuteczność leku.

W przypadku trudności z połykaniem całych kapsułek (szczególnie u małych dzieci), można wysypać peletki z kapsułki, wymieszać z niewielką ilością "kwaśnego" pokarmu (np. mus jabłkowy czy pomidorowy) i bez żucia natychmiast połknąć, a następnie popić szklanką wody lub soku.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, w ostrym zapaleniu trzustki oraz w pogorszeniu przewlekłego zapalenia.

Skład

Substancją czynną leku jest pankreatyna. 1 kapsułka zawiera pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową.

Pozostałe składniki to: **peletka**: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; / otocзка kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172); / otocзка kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).