




apteka
w sieci

Neocate Junior o smaku waniliowym 400 g

Cena: 130,61 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	400 g
Producent	Nutricia
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie

400 g

Działanie

Neocate Junior to kompletna pod względem odżywczym żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, oparta na aminokwasach, pozbawionych właściwości alergicznych. Oznacza to, że **Neocate Junior** nie wywołuje reakcji alergicznych u niemowląt z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego. Jest to ważne, aby w ciężkiej postaci alergii na białko mleka krowiego podawać produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby dzieci na diecie eliminacyjnej po 1. roku życia, które różnią się od potrzeb niemowląt.

Wskazania

Neocate Junior wskazany jest do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w:

- alergii na białka mleka krowiego,
- złożonej nietolerancji białek pokarmowych,
- innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenia muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Zalecane stężenie: 2,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Tabela żywienia (o ile lekarz nie zaleci inaczej)

Ilość płaskich miarek	Woda (ml)
1 (7,3 g)	30
3 (21,9 g)	90
10 (73 g)	300

Przygotowanie

1. Umyć ręce. Używać czystych naczyń. Odmierzyć wymaganą objętość wody i wlać do naczynia.
2. Napełnić proszkiem miarkę załączoną do opakowania. Nadmiar proszku usunąć czystym, suchym nożem. Nie ubijać proszku w miarce. Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania. Dodać zalecaną ilość miarek proszku do wody.
3. Zamknąć naczynie i wstrząsać, aż proszek się rozpuści. Produkt przygotowany do spożycia przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Wstrząsnąć lub zamieszać bezpośrednio przed podaniem. Produkt stosowany doustnie najlepiej podawać schłodzony.

Uwagi

Nie gotować przygotowanego posiłku. Nie używać kuchenki mikrofalowej do przygotowania lub podgrzania posiłku. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Skład

Suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej ziaren palmowych i/lub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-lizyny, L-treonina, cytrynian potasu, L-tyrozyna, aromat, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodorofosforan disodu, węglan wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-feniloalanina, wodorofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diwinian choliny, L-tryptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, przeciwutleniacze (lecytyny (lecytyna słonecznikowa), palmitynian L-askorbylu), tauryna, inozytol, substancja słodząca (sukraloza), siarczan żelaza(II), L-karnityna, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi(II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinyli, jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, chlorek chromu(III), selenian(IV) sodu, fitomenadion, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.